

“USO EXCLUSIVO EN JARDINERÍA”

Antex[®]

HORMIGUICIDA CEBO GRANULADO



abamectina

Insecticida / Gránulos / Lactona Macroclícica

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente Activo:	% en peso
Abamectina: (Avermectina)	
Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos del 80% de avermectina B1a y no más del 20% de avermectina B1b	
CONTENIDO NOMINAL.....	0.05
(Equivalente a 0.5 g de l.a./kg de formulación a 20°C)	
Ingredientes inertes:	
Vehículo y atrayente.....	99.95
TOTAL :	100.00

No. de registro: RSCO-JAR-INAC-174-313-057-0.05

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
PRECAUCIÓN

No. de lote:
Fecha de elaboración (DD/MM/AA)

Fecha de Caducidad:
2 años a partir de su elaboración.

Titular del registro y distribuidor
Allister de México S.A de C.V
Circunvalación Sur No.5 C.P.45070
Col. Las fuentes; Zapopan, Jalisco
Tel. (33)31 33 98 00

Contenido Neto: 227 g

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

EL FIN DE LAS HORMIGAS PICADORAS



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE AL CONTACTO CON LOS OJOS”

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Llamar inmediatamente al médico. Si el producto ha hecho contacto con la piel, lave perfectamente con agua y jabón. En caso de que el producto haya caído en los ojos lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido no provoque el vómito y llame al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo Químico: Producto que pertenece al grupo químico *Lactona macroclícica* (producto derivado de la fermentación natural del hongo *Streptomyces avermitilis*)

Antídoto: No posee antídoto específico. **Tratamiento:** Use tratamiento sintomático. La intoxicación seguida por la ingestión del producto puede ser minimizada induciendo el vómito dentro de los 30 primeros minutos después de la exposición. Si la toxicidad progresa hasta causar vómito severo, debe evaluarse el grado de desequilibrio electrolítico apropiado, junto con otras medidas de soporte (mantenimiento de la presión arterial), como lo indiquen los signos, síntomas y demás mediciones clínicas. En casos severos, se debe continuar observando al paciente por varios días, hasta que la condición clínica sea estable y normal. Debido a que la Abamectina aumenta la actividad del ácido gamma amino butírico en animales, es prudente evitar drogas que aumenten la actividad de esta sustancia (barbitúricos, benzodiazepinas, ácido valproico). **Signos y síntomas de Intoxicación:** Puede causar dilatación de las pupilas, falta de coordinación y convulsiones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.”

GARANTÍA

ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto esta compuesto por los ingredientes que se especifican. Debido a que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control **ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** no se hace responsable de posibles resultados adversos.

“INSTRUCCIONES DE USO”

“ANTEX” es un insecticida a base de Abamectina. Se recomienda su uso para el control de las hormigas que a continuación se mencionan:

- Hormiga cosechadora *Pogonomirax sp*
- Hormiga de fuego *Solenopsis sp*
- Hormiga argentina *Iridomyrmex humilis*
- Hormiga faraona *Monomorium pharaonis*
- Hormiga de cabeza grande *Pheidole megacephala*
- Hormiga de pavimento *Tetramorium sp.*
- Pequeña hormiga de fuego *Wasmania auropunctata*
- Hormiga doméstica *Tapinoma spp*

TIEMPO DE REENTRADA: Inmediato

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

ANTEX” viene listo para usar. Se recomienda aplicar la cantidad suficiente de producto alrededor del hormiguero y los caminos, cuando este presente mayor actividad, generalmente durante el atardecer y la noche. Revisar los hormigueros para confirmar que la hormiga se esté llevando el cebo al interior, y si la actividad disminuye. Repetir la aplicación hasta disminuir por completo la actividad del hormiguero.

CONTRAINDICACIONES

Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.

“HECHO EN MÉXICO”



PRECAUCIÓN

